



**Orrsövény ferdülés miatt végzett műtét**  
**BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYZŐ NYILATKOZAT**

Alulírott ..... (név) ..... (születési hely, idő)  
..... (anya neve) ..... (TAJ szám) tanúsítom,  
Hogy engem Dr ..... kellő mértékben felvilágosított az alábbiakról:

A betegségről, amely kórisme szerint (magyarul, esetleg latinul): .....

A javasolt gyógymódról, amely (magyarul) **műtét**, annak kockázatairól, ..... és

A helyette alkalmazható gyógymódokról, mint: .....,

Valamint azok ismert kockázatairól és következményeiről. Ismertette az ajánlott és más szóba jövő kezelési eljárás előnyeit, illetve hátrányait. A javasolt gyógymód kockázatairól, lehetséges gyakoribb szövődményeiről és várható következményeiről szóban feltett kérdéseimre is megfelelő választ kaptam. Kellő idő állt rendelkezésemre ahhoz, hogy szabadon dönthessek arról, milyen kezelést szeretnék. Tudomásul veszem, hogy szakszerű kezelés esetén is előfordulhatnak az alábbi előre nem várható szövődmények, amelyek a várható gyógykezelést kedvezőtlenül befolyásolhatják

(a beteg aláírása előtt az orvos tölti ki olvashatóan, magyarul)

.....

Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott kezelése bármelyikének, vagy mindegyikének elutasítására. Ez esetben a kezelésem során a visszautasítás kapcsán bekövetkező szövődményekért, illetve a gyógyeredmény alakulásáért azokat az orvosokat, akiknek a kezelését nem fogadtam el, a felelősség alól felmentem.

A kezelésbe, (műtétbe stb.) való beleegyezésem, a tájékoztatás megértése alapján minden kényszertől mentesen adom. Ennek alapján kérem, hogy az alábbi kezelést (műtétet) elvégezzék (olvasható leírás)

.....



## **Orrsövényferdülés**

### **Műtéti indikáció:**

Az orrsövényferdülés csak műtéttel korrigálható, gyógyszeres vagy egyéb konzervatív terápiás lehetőség nem létezik. Orrsövénytűtét végzése akkor indokolt, ha a krónikusan fennálló orrlégzési panasz háttérében az orrsövény ferdesége áll, vagy a ferdeség része a gátolt orrpasszázst kiváltó, illetve fenntartó oknak. A beteg általános állapotától, illetve igényétől, valamint az operáló orvos véleményétől függően a műtét történhet altatásban vagy helyi érzéstelenítésben.

Orrsövénytűtétet végzünk azokban az esetekben, amikor chronikus orrlégzési panasz háttérében orrsövényferdülés áll. A műtét indoka a jobb orrlégzés, a kellemesebb közérzet biztosítása. Súlyosabb esetekben az orrlégzési zavarnak másodlagos következményei is kialakulhatnak, elhúzódo felsőléguti hurutok, orrmelléküreg gyulladások, az alsóbb légutak érintettsége, chronikus torok és garat bántalmak, a fülkürt működésének zavara, a középfül krónikus gyulladása. Ilyen esetekben az orrsövényferdülés műtéti megoldása még inkább indokolt. Olykor a horkolásos panasz háttérében is orrsövényferdülés okozta gátolt orrlégzés áll, melyet orrsövénytűtéttel javíthatunk. Fontos tudni azonban, hogy a horkolásnak számos más oka is lehet.

### **A műtét elhagyásának várható kockázatai:**

Az orrsövénytűtét az esetek jelentős részében életminőséget javító beavatkozás, elhagyásának ilyenkor nincs súlyos következménye.

Azokban az esetekben amikor a gátolt orrlégzés már másodlagos orrmelléküregi, fülészeti, torok, garat ill. alsóbb légúti megbetegedéseket okoz, a műtét elhagyása ezek állandósulását, fokozatos romlását idézheti elő. Kiemelendő, hogy bizonyos középfülműtétek előtt az orrlégzés rendezése szükséges. Ennek elhagyása a fülbetegség gyógyulási esélyeit csökkenti.

### **Műtéti technika:**

Az operáció többféle technikával végezhető. Általánosságban jellemző, hogy a műtét során az egyik orrbemenetben ejtett metszés után az orrsövény lágyrészeit az operáló orvos lefejti a ferde porc és csontos lemezről. A művelet már az érzéstelenítő oldat befecskendezésével megkezdődik, hiszen az operátor a folyadékot a porclemez és a porchártya közé fecskendezi. A folyadék utat képez magának, így rendkívül kíméletesen választódik le a lágyrész-borítás a csontos-porc sővényről. A lágyrész eltávolítása sebészi eszközökkel folyik tovább, majd a ferde csont és porclemezeket az orvos kibillenti ferde



# EUROP-MED Orvosi Szolgáltató Kft. Egészségügyi Központ

Főigazgató főorvos: **Dr. Kovács Attila**

helyzetükből, alakítja, egyenesíti azokat, részben el is távolíthat belőlük, végül a középvonalba helyezi a korábban szabálytalanul álló részeket. Ezt követi az egyenes helyzetbe hozott orrsövény rögzítése

tamponnal, esetleg varratokkal. Valamennyi sebési technika közös jellemzője, hogy metszés, esetleg varrat csak az orrüregen belül van.

Az orrtampon általában 2 napig (48 óráig) van az orrban. A kitamponált orrban kisebb mennyiségű véres, nyákos váladékozás előfordulhat. Az orrtampon viselése kellemetlen, a légzés csak a szájon keresztül lehetséges. Náthás érzet, fejfájás, esetleg hőemelkedés betamponált állapotban nem ritka. A tampon kiszedése néhány másodperces kellemetlenséggel jár, ritkán előfordulhat ilyenkor átmeneti, magától megszűnő vérzés. A műtét utáni időszakban, az operált ornyálkahártya regenerálódásának idején kisebb váladékszivárgás előfordulhat, a váladék pörkök formájában lerakódhat az orrban. Ennek puhítása céljából orrkenőcs használata indokolt. A műtét utáni időszakban általános testi kímélet javasolt, intenzív sport vagy fizikai terhelés csak egy hónap után lehetséges.

Orrsövényműtét után az orrlégzés javulása 4-6 hét múlva, az orrüreg teljes kitisztulása, a váladékképződés normalizálódása után várható, bár sok esetben már korábban is észlelhető a változás.

### **Az érzéstelenítés, és annak veszélyei:**

Először felületi érzéstelenítő szert juttatunk az orr nyálkahártyára. Ezt követően érösszehúzóval kombinált érzéstelenítő injekciót adunk az orrsövény szövetrétegei közé.

Az érzéstelenítő adása után esetleg kialakulhat: allergiás reakció

( vizenyő, bőrkiütés, viszketés, shock ) kóros reflexek, idegrendszeri mellékhatások( nyugtalanság, görcsök, légzéscsavar ), vérnyomás emelkedés, vérnyomás esés, szívritmuszavarok.

### **Általános műtéti kockázat:**

A műtét általános veszélyei úgymint thrombózis,/ embólia, sebfertőzés, keringési reakciók, az egyébként egészséges egyének esetében igen ritkák. A véralvadást befolyásoló gyógyszerek alkalmazása megnövelheti a műtét utáni utóvérzés rizikóját. A kábító és teljesítményfokozó szerek hatása alatt álló egyének gyógyszerekre, illetve a műtéti teherre való reakcióképessége megváltozhat, ezért kérjük, hogy az ilyen szerek fogyasztásának tényét -saját érdekében- közölje.

### **A műtét közvetlen mellékhatásai, veszélyei, szövődményei:**

**2040 Budaörs, Kossuth Lajos u. 9.**  
**Tel: 06-23-445-480, Fax: 06-23-445-470**





Műtét utáni jelenségek: 10-20 percig, esetleg egy-két órán át véres köpet, köhögési inger, köhögés. Az orr elé helyezett un. parittyakötés vérrel és orrváladékkal átívódik, ezért azt rendszeresen cserélni kell. Amíg tampon van az orrban ( 48 óra ), a légzés csak szájon át lehetséges.

**Ritkán előforduló távolabbi mellékhatások és szövődmények a műtét után:**

Utóvérzés jelentkezhethet elsősorban fizikai terhelés hatására a műtét utáni 2-3 hétben. Olykor az orr ismételt betamponálására van szükség.

Előfordulhat, hogy az orrsövény rétegei közt vérömleny alakul ki, melyet le kell bocsátani.

Az orrsövény és az orr oldalsó fala közt a nyálkahártya felszínének összenövése jöhet létre, melyek a szabad orrlégzést gátolják. Ilyenkor kisebb beavatkozással szüntethetők meg az összetapadások.

Az orrsövény nyálkahártyájának egy része elhalhat, és a sövény kilyukadása következhet be. Ez vagy egyáltalán nem okoz panaszt, vagy esetenként pörkösödést válthat ki.

**Gyógyulás várható időtartama:**

Eseménytelen gyógyulás várható időtartama 10-14 nap. Orrváladékozás, beszáradó pörkös váladék, változó mértékű orrdugulás több hétig is fennállhat.

**Tudomásul veszem,** hogy a beavatkozást követően hozzávetőleg 4 óra megfigyelést követően hazaengednek otthoni ápolásba.

A műtétet követő ellenőrző vizsgálatokon, utókezelésen / kötéscsere, varratszedés stb. / a megbeszélte időben részt veszek. Ennek elmulasztása esetén az ebből adódó egészség károsodásért, következményekért felelősség a beavatkozást végző orvost illetve az egészségügyi Szolgáltatót felelősség nem terheli.

**Kijelentem,** hogy önellátó vagyok. Otthon illetve tartózkodási helyemen lakás-és higiénés körülményeim megfelelőek, telefonnal rendelkezem, felügyeletem is megoldható.

A fenti tájékoztatás alapos megismerése után **beleegyezésemet** és **hozzájárulásomat** adom ahhoz, hogy rajtam a tervezett beavatkozást egynapos sebészeti beavatkozás formájában elvégezzék.

**Aláírással igazolom,** hogy a műtétemmel kapcsolatban minden felvilágosítást és magyarázatot megkaptam, számomra elegendő a kapott felvilágosítás, további felvilágosítás nem szükséges, egyéb kérdésem nincs. Döntésem meghozatalához elegendő idő állt rendelkezésemre, a döntést kényszerből mentesen, tiszta tudattal hoztam meg.

.....  
beteg vagy törvényes képviselőjének aláírása



Aláírással megerősítve kinyilvánítom, hogy betegségem természetéről, gyógykezelésem részleteiről, különösen pedig a gyógyulási kilátásaimról nem kívánok részletes felvilágosítást kapni. A döntéseket a kezelőorvosaimra bízom.

(Ezt a nyilatkozatot – elfogadás esetén – aláírásával kérjük erősítse meg! E megerősítő nyilatkozat hiányában tájékoztatásról való lemondás érvénytelen.)

A lemondó nyilatkozatot megerősítem:

.....  
beteg vagy törvényes képviselőjének aláírása

Előttük, mint tanúk előtt:

1.) Név: .....	2.) Név: .....
Lakik: .....	Lakik: .....
Sz. ig. sz.: .....	Sz. ig. sz.: .....

Hozzá tartozóim tájékoztatásáról a következőket rendelem:

Az alább megnevezett hozzátartozóimat betegségemről teljes körűen tájékoztassák:

.....  
.....

Az alább megnevezett hozzátartozóimat betegségemről az általam megjelölt korlátozásokkal tájékoztassák:

.....  
.....

Az alább megnevezett hozzátartozóimat betegségemről kérésükre se tájékoztassák:

.....  
.....

Háziorvosomat kérésére, betegségemről teljes körűen tájékoztassák / ne tájékoztassák.

(A kívánt rész aláhúzendó.)

Budaörs, 20.....

.....  
kezelőorvos aláírása

P.H

.....  
A beteg vagy törvényes képviselőjének aláírása

Előttük, mint tanúk előtt:

1.) Név: .....	2.) Név: .....
Lakik: .....	Lakik: .....
Sz. ig. sz.: .....	Sz. ig. sz.: .....